

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

صرع

۱- تظاهرات Autonomic در جریان صرع از لحاظ Classification جزء کدامیک از موارد زیر قرار می‌گیرد؟

FOCAL MOTOR

NON MOTOR ONSET

UNKNOWN ONSET

GENERALIZED MOTOR

منبع:

آدامز ص ۳۲۱ جدول ۱۵-۱

۲- کدامیک از انواع صرع با DAY DREAM قابل اشتباه است؟

TLE

ABSCENCE

FLE

JME

منبع:

آدامز ص ۳۲۳ ستون ۲ پ ۲ سطر ۹

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۳ - PYKNOEPILEPSY به کدامیک از انواع صریح اطلاق می‌گردد؟**ABSCENCE

JME

TLE

OCCIPITAL LOBE

منبع:

آدامز ص ۳۲۳ ستون ۲ پ ۲ سطر ۲

۴ - در سابقه کدامیک از انواع تشنج INFANTILE SPASM وجود دارد؟

OCCIPITAL LOBE

JUVENILE MYOCLONUS

LENNOX – GASTAUT

ATYPICAL ABSENCE

منبع:

آدامز ص ۳۲۴ س ۲ پ ۱ سطر ۱۳

۵ - پروگنوز کدامیک از انواع تشنج از همه بدتر است؟

ATYPICAL ABSENCE

JUVENILE ABSCENCE

JUVENILE MYOCLONUS

LENNOX – GASTAUT **منبع:**

آدامز ص ۳۲۴ س ۲ پ ۱

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

۶- کدامیک از تشنج های زیر با FALLING مکرر همراه است؟

ABSCENCE EPILEPSY

JUVENILE MYOCLONUS

INFANTILE SPASM

LENNOX – GASTAUT



منبع:

آدامز ص ۳۲۴ س ۲ پ ۱

۷- احساس GUSTATORY در صریح کدامیک از قسمت های زیر دیده می شود؟

FRONTAL

INSULA



PREROLANDIC GYRUS

AMYGDAL

منبع:

آدامز ص ۳۲۴ جدول ۱۵-۲

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

آزمون: صریح مدت آزمون: 100 - ۸ EYELID MYOCLONIA با کدامیک از انواع صریح همراه است؟

TLE

FLE

ATYPICAL ABSENCE

TYPICAL ABSENCE

منبع:
آدامز ص ۳۲۴

JAKSONIAN EPILEPSY - ۹ در صریح کدامیک از لوب‌های زیر بیشتر دیده می‌شود؟

PARIETAL

OCCIPITAL

TEMPORAL

FRONTAL منبع:
آدامز ص ۳۲۶

۱۰- بیماری در جریان اپی لیپسی ابتدا STARRING سپس اتوماتیسم با دست راست و سپس به راست و سپس به چپ دارد کدامیک از تشخیص‌های زیر مطرح است؟ nonforceful head rotation forceful head rotation

Lt side frontal lobe epilepsy

Rt side temporal lobe epilepsy

Rt side parietal lobe epilepsy

Lt side occipital lobe epilepsy

منبع:
آدامز ۲۰۲۳ ص ۳۲۶

۱۱- تحریک کدامیک از مناطق زیر در کورتکس موجب چرخش سر و چشم یکطرفه در طی تشنج میشود؟

منطقه ۶

منطقه ۴

منطقه ۴۴

منطقه ۸



منبع:

آدامز ص ۳۲۶ س ۱ پ ۵

۱۲- هالوسیناسیون بویایی در جریان تشنج مربوط به تحریک کدامیک از قسمتهای زیر است؟

هیپو کمپ

پارا هیپو کمپ



آمیگدال

پریتال اوپرکولار

منبع:

آدامز ص ۳۲۶ ستون ۲ پ ۴

آزمون: صرع مدت آزمون: 100**۱۳- در جریان تشنج احساس تشنگی مردبوط به تحریک کدامیک از قسمتهای زیر است؟**Parietal opercular

Frontal opercular

Medial temporal

Amygdala

منبع:

آدامز ص 327 ستون ۱ پ ۱

۱۴- اوتوسکوپی در کدامیک از انواع صرع دیده میشود؟

Occipital lobe epilepsy

Frontal lobe epilepsy

Temporal lobe epilepsy

Uncinate seizure

منبع:

آدامز ص ۳۲۶ س ۲ پ ۴

۱۵- DEJA VU از علائم مشخصه کدامیک از انواع صرع می باشد؟TLE

FLE

OLE

JME

منبع:

آدامز ص ۳۲۷ ستون ۲ پ ۴

۱۶- علائم صریح کودکی ۱۲ ساله شامل BLINKING – STARRING اتوماتیسم کوتاه مدت و عدم توجه کامل در مدت تشنج می باشد.
کدمیک از انواع تشنج بیشتر مطرح می باشد؟

TLE

FLE

JME

ABSCENCE



منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ص ۳۲۷ پ ۳

۱۷- بیماری دچار صریح لوب تمپورال است و در فاز پست ایکتال سرگردان و بی هدف راه می رود. این علامت چه نام دارد؟

Volvular

Procorsiva

Jamis vu

Periomania



منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ص ۳۲۸ پ ۲

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۱۸- کدامیک از علائم زیر افتراق دهنده ی صریح لوب تمپورال و ابسنس می باشد؟**

اورا



اختلال توجه

اتوماتیسم

تغییر در قدرت عضلانی

منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ص ۲ پ ۱۴

GELASTIC EPILEPSY - ۱۹

آنژیوم لوب تمپورال

گانگلیوگلیوم تمپورال

گلیوبلاستوم فرونتمال

هامارتوم هیپوتalamوس

**منبع:**

آدامز ص ۳۲۸ ستون ۲ پ ۲

۲۰- کدامیک از علائم زیر ارزش تشخیصی لترالیزه صریح ندارد؟

Post ictal automatism



Todds paralysis

Forced head deviation

Unilateral hand dystonia

منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ص ۳۲۹ ستون ۱ پ ۱

۲۱- کدامیک از انواع تشنج بهتر به داروهای آنتی اپی لپتیک پاسخ می دهند؟

Infantile spasm

Lenox gaustate

Atypical absence

Rolandic seizure



منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ص ۳۳۱ ستون ۱ پ ۱

۲۲- کدامیک از انواع تشنج از کودکی شروع شده و دارای سیر خوش خیمی بوده، به یک دارو پاسخ می دهد و در زمان بلوغ تدریجاً ناپدید می گردد ولی Dyslexia ممکن است از خود باقی بگذارد؟

TLE

Occipital lobe epilepsy

FLE

Rolandic seizure



منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ستون ۱ پ ۱

آزمون: صرع مدت آزمون: 100

۲۳- کدامیک از انواع تشنج به تجویز ACTH پاسخ میدهد؟
بصورت تهوع و استفراغ طولانی مدت در ناحیه اکسی پیتال که با خواب

Rolandic

LGS

Temporal

Panyiotopolus



منبع:

آدامز ۲۰۲۳ ص ۳۳۱ س ۱ پ ۲

۲۴- کدامیک از انواع تشنج بصورت دراماتیک به تجویز ACTH پاسخ میدهد؟

LGS

ROLANDIC

INFANTILE SPASM



PANYIOTOPOLUS

منبع:

آدامس ص ۳۳۱ س ۱ پ ۳

۲۵- کدامیک از انواع تشنج در ارتباط با توبروس اسکلروزیس می باشد؟

LENOX GASTAUT

FEBRILE CONVULSION

TEMPORAL LOBE EPILEPSY

INFANTILE SPASM



منبع:

آدامز ص ۳۳۱ س ۱ پ ۳

۲۶- آنتی بادی علیه رسپتور گلوتامات (GluR3) موجب بروز کدامیک از انواع تشنج میشود؟

TEMPORAL LOBE EPILEPSY

FRONTAL LOBE EPILEPSY

LENOX GASTAUT

EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA

منبع:

آدams ص 333 س 1 پ ۲

۲۷- در شروع بیماری راسموسن علاوه بر تجویز داروهای آنتی اپی لیپتیک کدامیک از درمانهای زیر موثرتر است و پیشنهاد میگردد؟

High dose corticosteroid

IVIG

PLASMA Exchange

Partial hemispherectomy

منبع:

آدams ص 333 س 1 پ ۳

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

- ۲۸- در EEG فردی در مراحل اولیه خواب امواج positive sharp wave در ناحیه اکسی پیتال دیده میشود و با عمیق شدن خواب و همچنین در بیداری از میان میرود. کدامیک از موارد زیر در مورد وی درست است؟

صریح لوب اکسی پیتال مطرح است

نیاز به درمان با کاربامازپین دارد.

باید از لحاظ خصایعات لوب اکسی پیتال بررسی شود.

پدیده نرمال است و نیاز به اقدام خاصی ندارد



منبع:

آدامز ص ۳۴۶ س ۱ پ ۲

- ۲۹- کدامیک از یافته های آزمایشگاهی زیر پس از تشنیج ژنرالیزه نیاز به اقدام اورژانسی و موثر دارد؟

افزایش نسبی CPK

افزایش مختصر پروتئین مایع نخاعی

کاهش مختصر ph خون

CSF با ارجحیت Pleosytosis



منبع:

آدامز ص ۳۴۶ س ۲

- ۳۰- معاینه ته چشم در مصرف کدام دارو توصیه میشود؟

Prampanel

Topiramate

Ethosuximide

Vigabatrin



منبع:

آدامز ص ۳۴۷ جدول ۵-۱۵

۳۱- کدامیک از داروهای زیر در شیردهی safe‌تر است؟

کاربامازپین

اتوسوکسماید

لاموتربیزین

سدیم والپورات



منبع:

آدامز ص ۳۴۵ س ۱ پ ۱

۳۲- استفاده از کدام دارو در زمان بارداری باعث تاثیرات منفی در IQ کودک در آینده میشود؟

سدیم والپورات



لوبل

لاموتربیزین

فنی توابین

منبع:

آدامس ص ۳۴۵ س ۱ پ ۳

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

۳۳- پترن شایع EEG در کدام است؟ infantile spasm

Generalized fast

GRDA

Hypsarrhythmia

Triphasic

منبع:

مریت ص ۱۹۹۳

۳۴- خانم باردار که دچار اکلامپسی شده و علیرغم تجویز سولفات منیزیم تشنج وی کنترل نشده است. اقدام بعدی کدام است؟

فني تويين

لوبيل

لاکوزامید

سدیم والپورات

منبع:

آدامز ص ۳۴۶ س ۳ پ ۳

۳۵- کدامیک از داروهای زیر از طریق تاثیر بر رسپتورهای AMPA باعث کنترل تشنج میشود؟

والپورات

فنوباربیتان

لوبيل

توبیرامات

منبع:

آدامز ص ۳۴۷ جدول ۵-۱۵

۳۶- تجویز طولانی مدت کدام داروی آنتی اپی لپتیک سبب TOLERANCE میشود؟

لوتیراستام

والپورات

کلوبازام



لاکوزامید

منبع:

آدامز ص ۳۴۷ جدول ۱۵-۵

۳۷- داروی First line برای درمان میوکلونوس کدام است؟

لوبل



توبیرامات

لاموتربیزین

فنوباربیتال

منبع:

آدامز ص ۳۴۸ جدول ۱۵-۷

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

۳۸- بیماری بدنبال مصرف کاربامازپین دچار حساسیت پوستی شده است. کدامیک از داروهای جایگزین ارجح است؟

فني توبين

لاموتربیزین

فنوباربیتال

سدیم والپورات

**منبع:**

آدامز ص ۳۴۹ س ۲ پ ۴

۳۹- مکانیسم کدامیک از داروهای زیر تاثیر بر SV2A می باشد؟

کاربامازپین

فلبامات

توبیرامات

لوتیراستام

**منبع:**

آدامز ص ۳۵۱ شکل ۱۵-۱۴

۴۰- ایجاد سنگ کلیه از عوارض کدامیک از داروهای زیر می باشد؟

Lamotergine

Phenobarbital

Clobazam

Topiramate

**منبع:**

آدامز ص ۳۵۳ س ۱ پ ۴

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

- ۱۴۱- بیماری با شک به تشنج به اوژانس مراجعه میکند؛ در موقع معاینه چشم ها بسته- حرکات افقی سر به طرفین- حرکات پرشی اندام غیر همزمان دوطرف داشته و در طول حمله علائم متفاوتی نشان میدهد کدامیک از تشخیص های زیر مطرح می گردد؟

CONVULSIVE SEIZURE

CATAPLEXY

NCSE

PNES



منبع:

مریت ص ۱۶۸ ج ۷-۲

Figure-of-four - ۱۴۲ حین تشنج به نفع درگیری کدام منطقه است؟

angular gyrus

Contralateral SMA

Contralateral BG

opercular

منبع:

مریت ص ۱۶۸ ج ۷-۲

آزمون: صرع مدت آزمون: 100**۱۴۳- همه آنتی بیوتیک های زیر سبب کاهش آستانه تشنج میشوند بجز؟**آزیتروومایسین

ایمی پنم

ابزونیازید

مترونیدازول

منبع:

مریت ص ۱۴۲۰ جدول ۷.۳

۱۴۴- هدف از تجویز داروهای سداتیو در مرحله REFRACTORY SEIZURE رسیدن به کدامیک از موارد زیر در EEG می باشد؟

Generalized slowing

Burst suppression

Iso Electric Pattern

BI-PLED

منبع:

مریت ص ۱۴۲۷ شکل ۷۰۲

۱۴۵- در میان داروهای بنزودیازپین در درمان خط اول استاتوس کدامیک ارجح است؟

دیازپام

لورازپام

میدازولام

کلونازپام

منبع:

مریت ص ۱۴۲۴ پ ۱ سطر ۵

۴۶- کدامیک جزو موارد پیشگویی کننده intractable epilepsy ننمی باشد؟

Onset age > 2 yrs

LOW IQ

brain damage

Presence of atonic seizure

منبع:

مریت ص 1970 جدول

۴۷- در تشنجات شایعترین کانون تشنج کدام منطقه است؟ focal impaired awareness

تمپورال

فرونتال

اکسی پیتال

پریتال

منبع:

مریت ص 1981

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

۴۸- احتمال seizure free بدنیال جراحی در صرع های تمپورال مقاوم به درمان چقدر است؟

۵۰%

۲۰%

۸۰%

۱۰۰%

منبع:

مریت ص ۱۹۸۷

۴۹- در سندرم Gastaut امواج epileptiform در کدام ناحیه غالباً دیده میشود؟

فرونتال

تمپورال

پریتال

اکسی پیتال

منبع:

مریت ص ۱۹۹۲

۵۰- سن شروع سندرم راسموسن معمولاً در چه سنی می باشد؟

کمتر از ۱۰ سال

کمتر از ۲ سال

کمتر از ۶ ماه

بیشتر از ۲۰ سال

منبع:

مریت ص ۱۹۹۵

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

۵۱- زمان T1 و T2 در تشنج استاتوس فوکال و ابسنس چقدر است؟

10 min/60 min

5 min/30 min

10 min/30 min

5 min/60 min

منبع:

کانتینیوم ص ۵۶۰

۵۲- محتمل ترین مکانیسم آنتی اپی لیپتیک GABAPENTIN کدام است؟

تاثیر بر رسپتور GABA

تاثیر بر کanal سدیم

تاثیر بر کanal کلسیم

تاثیر بر رسپتورهای NMDA

منبع:

آدامز ص ۳۵۳ س ۱ پ ۳

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۵۳- عارضه کدام دارو Prolongation PR-interval است؟**

لاکوزامید



سدیم والپورات

لوتیراستام

فنوباربیتال

منبع:

کانتینیوم ص ۵۲۴

۵۴- جهت ثبت امواج اپی لپتی فرم نیاز به فعالیت حداقل چه مساحتی از کورتکس می باشد؟5cm²15 cm²10 cm²20 cm²**منبع:**

کانتینیوم ص ۲۶۳

۵۵- Transmantle sign در کدام تیپ FCD دیده میشود؟

I

IIa

IIb



III

منبع:

Continuum 2022- page 314

-۵۶- نمای popcorn کدامیک از ضایعات زیر دیده میشود؟

DNET

ganglioglioma

MTS

cavernoma



منبع:

کانتینیوم ص ۳۱۶

In which of the following childhood epilepsies should the ketogenic diet be considered early if patients do not respond to initial medical therapy?

-۵۷

atypical childhood epilepsy with centrotemporal spikes

Dravet syndrome

epilepsy with eyelid myoclonias

myoclonic-atonic epilepsy



منبع:

Continuum 2022- page 609

A 10-year-old girl with Rasmussen encephalitis has multiple seizures per day that have been refractory to adequate trials of carbamazepine, lacosamide, levetiracetam, and valproic acid. Which of the following treatments is most likely to result in seizure freedom? -۵۸

gabapentin

hemispheric disconnection surgery ✓

IVIg

mycophenolate mofetil

منبع:

Continuum 2022- page611

In a prospective observational cohort study, what was found regarding fertility in women with epilepsy compared with a control group? -۵۹

higher miscarriage rates

higher rate of anovulatory cycles

lower pregnancy rates

no difference in time to pregnancy ✓

منبع:

Continuum 2022- page611

Which of the following antiseizure medications has no effect on and is unaffected by hormonal oral contraceptives? -۶۰

clobazam

oxcarbazepine

perampanel

zonisamide 

منبع:

Continuum 2022- page611

Which of the following antiseizure medication has the lowest risk of major congenital malformations when taken during pregnancy? -۶۱

carbamazepine

levetiracetam 

phenobarbital

phenytoin

منبع:

Continuum 2022- page612

Which of the following is the most common underlying cause of neonatal seizures? -۶۲

congenital malformation

genetic disorder

hypoxic-ischemic encephalopathy

infection

: منبع

Continuum 2022- page612

A 3-year-old child has a febrile seizure in the setting of an upper respiratory infection. Which of the following features would increase the likelihood that the child will subsequently develop epilepsy? -۶۳

family history of febrile seizures

focal seizure onset

headache (lasting 2 hours) after the seizure

seizure duration of 90 seconds

: منبع

Continuum 2022- page612

Among children with epilepsy, which of the following features is associated with an increased risk of sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)? -۶۴

late age of seizure onset

low seizure frequency

nocturnal generalized tonic-clonic seizures

normal brain MRI

: منبع
Continuum 2022- page612

Which of the following medication combinations is most effective for infantile spasms? -۶۵

levetiracetam and levothyroxine

oxcarbazepine and cannabidiol

prednisone and acetazolamide

vigabatrin and adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

: منبع
Continuum 2022- page613

Which of the following antiseizure medications is least likely to be associated with psychiatric side effects? -۶۶

levetiracetam

oxcarbazepine

phenobarbital

pregabalin

: منبع
Continuum 2022- page613

For a first episode of psychosis in a patient with epilepsy, what would be the first-choice antipsychotic medication?

-۶۷

aripiprazole

clomipramine

fluphenazine

risperidone



منبع:

Continuum 2022- page613

For children with attention deficit hyperactivity disorder and epilepsy, treatment with an antiseizure medication and a stimulant is associated with which of the following?

-۶۸

decreased serum antiseizure medication levels

improved attention in the majority of patients



increased risk of antiseizure medication side effects

increased risk of breakthrough seizures

منبع:

Continuum 2022- page613

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**Ophthalmologic evaluation is important with the use of which of the following antiseizure medications?****-۶۹**

cenobamate

fenfluramine

rufinamide

vigabatrin

**: منبع**

Continuum 2022- page615

What is the most prevalent etiology of pediatric new-onset refractory status epilepticus (NORSE)?**-۷۰**

autoimmune disorders

congenital brain malformations

degenerative disorders

infections

**: منبع**

Continuum 2022- page617

۷۱- درکدام سندروم علایم اتونوم برجسته است؟

Dravet

panyiotopolus



West

Absence

: منبع

کانتینیوم ص ۳۴۸

۷۲- کدامیک از سندروم های زیر در هر سنی معمولاً شروع می شوند؟

Epilepsy with myoclonus atonic

Lennox- Gastaut

Rasmussen

Progressive myoclonus epilepsy



: منبع

Continuum 2022- page248

۷۳- تصویربرداری در کدامیک از بیماران پیشنهاد می شود؟

Self limited focal epilepsy

Absence

JME

Adult new onset unprovoked



: منبع

Continuum 2022- page255

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۷۴- کدامیک از داروهای زیر تاثیر واضحی روی وزن ندارد؟**

zonisamide

valporate

topiramate

lamotrigin



Continuum 2022- page487

۷۵- همه موارد در مورد cavernous angioma صحیح است بجز؟

کمتر با رکورانس تشنج همراه است

در ۹۱% سال عود می کند

جزء موارد اندیکاسیونهای جراحی صریح است

به تشخیص کمک می کند Gradian Echo و SWI

Continuum 2022- page242

۷۶- در مورد پروتکل HARNESS-MRI همه موارد صحیح است بجز؟

برای اکثر بیماران با تشنج قابل انجام است

برای ۱.۵ تسلو و ۳اتسلا نیز قابل انجام است

است Optional ، SWI

در T2 آناتومی و مورفولوژی ارزیابی دقیق تر می شود

Continuum 2022- pages312

172.20.64.56/ReportControl/ReportAzmoon?full=1&TestId=6980

31/41

۷۷- در مورد سندروم Leavons همه موارد صحیح است بجز؟

۸۰ درصد موارد مقاوم به درمان است

روزانه حملات مکرر eyelid myoclonia میدهد

تست ژنتیک اکثرا مثبت است



۲۳-۳۵ درصد اختلال يادگیری mild-mod دارند

منبع:

کانتینیوم ص ۳۴۴

۷۸- خط اول درمان استاتوس out of hospital کدام است؟

میدازولام اینترانازال یا بوکال



دیازپام رکتال

میدازولام IV

لورازپام IV

منبع:

کانیتینیوم ص ۵۶۹

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**7۹ - در کدامیک از انواع آنسفالیت اتوایمیون شایع ترین تشنج می باشد؟**Anti LGI1

Anti NMDA

AntiGABA A

AntiGABA B

منبع:

Continuum 2022- page369

8۰ - نمای اختصاصی کدامیک از آنسفالیت های اتوایمیون است؟ Extreme Delta Brush

Ant- LGI1

Ant -NMDA

Ant-GABA A

Ant-GABA B

منبع:

Continuum 2022- page369

8۱ - بررسی HLA-B 1502 در کدامیک از داروهای زیر موثرتر است؟ drug reaction

لوبل

فنوباربیتان

زونیسامید

کاربامازپین **منبع:**

آدامز ص ۳۴۹ س ۲ پ ۱۶

آزمون: صریح مدت آزمون: 100

۸۲- خانمی که مبتلا به اپی لیپسی و تحت درمان با سدیم والپورات است و قصد حاملگی دارد تغییر دارو از سدیم والپورات به کدام دارو ارجح است؟

Carbamazepine

Oxcarbamazepin

Topiramate

Levetiracetam 

منبع:

آدامز ص ۳۵۰ س ۱ پ ۳

۸۳- بیماری بدلیل استاتوس اپی لیپسی تحت درمان با سدیم والپورات تزریقی است. حداکثر سرعت تزریق این دارو بر اساس چقدر است؟ KG/MIN

3 

10

1

5

منبع:

آدامز ص ۳۵۲ س ۲ پ ۳

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۸۴- همه داروهای زیر باعث کاهش Progestin می‌شوند بجز؟**توبیرامات

لاموتربیزن

کاربامازیبین

کلوبازام

منبع:

Continuum 2022- page410

۸۵- کدامیک از روش‌های جلوگیری کمترین میزان حاملگی ناخواسته را در بیماران صرعی در سال اول ایجاد می‌کند؟Progesterone only intrauterine device

Progesterin only Pill

Tubal ligation

Diaphragm

منبع:

Continuum 2022- page409-T 6-2

۸۶- در مورد Malformation و حاملگی همه موارد صحیح است بجز؟

پلی تراپی با سدیم ریسک را افزایش می‌دهد

پلی تراپی با توبیرامات ریسک را افزایش می‌دهد

ژنتیک نقشی در ایجاد Malformation ندارد

در بیش از ۱۵۰۰ میلی گرم در سدیم والپروات ریسک را زیاد می‌کند

منبع:

Continuum 2022- page415

۸۷- کدامیک از داروهای زیر در حاملگی کمتر کاهش می یابد؟

لوتیراستام

لاموتیرین

کارمازپین

فنی توبیین

منبع:

Continuum 2022- page419-T 6-3

۸۸- همه داروهای زیر باعث کاهش تشنج در JME میشود بجز؟

ویگاباترین

توبیرامات

بنزو دیازپین

کتوئنیک

منبع:

Continuum 2022- page437-T

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۸۹- امواج خواب ماگزینم در چه منطقه‌ای دیده می‌شود؟ sleep spindle**

frontopolar

T3 & T4

Occipital

C3 & C4

**منبع:**

ابوخلیل ص ۱۰۸ جدول ۵.۳.۱

۹۰- امواج general rhythmic delta activity در صورت مشاهده در EEG غالباً در کدام منطقه دیده می‌شوند؟

تمپورال

اکسی پیتال

سنترال

فرونتال

**منبع:**

ابوخلیل ص ۱۴۸

۹۱- اثربخشی Fenfluramine در کدامیک از بیماری‌ها بیشتر است؟

Dravet



Lennox Gastaut

GTC

Atypical Absence

منبع:

Continuum 2022- page 528

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۹۲- در کدامیک از بیماری‌های زیر FDA APPROVED است؟ Rufinamide**

Dravet

JME

Atypical Absence

Lennox Gastaut

**منبع:**

Continuum 2022- page526

۹۳- کدام گزینه در مورد Perampanel صحیح است؟

فقط به عنوان Adjunctive در صریع فوکال استفاده می‌شود

فقط می‌تواند به عنوان مونوتراپی در صریع فوکال استفاده شود

در صریع GTC به عنوان کمکی استفاده نمی‌شود

ممکن است در Progressive myoclonic epilepsy استفاده شود

**منبع:**

Continuum 2022- page526

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**-۹۴- در کدامیک از انواع صریح ها توسط FDA مورد تایید است؟ Cannabidiol**Dravet

JME

ولیه GTC

Reflex epilepsy

منبع:

Continuum 2022- page527

-۹۵- جمله صحیح در مورد Brivaretacem کدام است؟

اثر بر روی وزیکول های SV2A با قدرت مشابه با لوتیراستام

کمتر از لوتیراستام تداخل دارویی دارد

بیشتر از لوتیراستام نفوذگذاری در مغز دارد

دوغاز مشابه لوبل دارد

منبع:

Continuum 2022- page523

-۹۶- [به نفع درگیری کدام ناحیه است؟ Ictal poutingAnt cingulate

Orbitofrontal

Temporal

Occipital

منبع:

ابوخلیل ص ۱۴۳

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۹۷- پروگنووز در کدامیک از صرع های زیر بدتر است؟**Eye lide myoclonic

JME

Typical absence

Juvenile Absence

منبع:

Continuum 2022- page547

۹۸- جمله غلط را در Genetic Generalized epilepsy انتخاب نمایید؟

زمینه EEG نرمال

مغز MRI

تست ها ژنتیک معمولاً مثبت است

امواج اینتراکتال دوطرفه است

منبع:

Continuum 2022- page343

آزمون: صریح مدت آزمون: 100**۹۹- شایعترین اورا در تشنج لوب تمپورال کدام است؟**

Olfactory

Psychic aura

Cephalic aura

Epigastric aura **منبع:**

ابوخلیل ص ۱۴۹ س ۲ پ ۲

۱۰۰- در کدامیک از سندروم های زیر تعداد تشنج ها اندک است؟Panayiotopoulos

Gastaut

Frontal lobe

Atypical Absence childhood

منبع:

Continuum 2022- page347-T